



مجتمع درمانگاهی امام رضا (ع)

و شهید مطهری

اندوسکوپي

تهیه کننده : فرجس شبانی

منبع : پرستاری داخلی و جراحی

برونر و سودارت ویراست ۲۰۱۸،

گوارش

زمستان ۹۹

اندوسکوپي :

از طریق اندوسکوپي پزشک می تواند مری ، معده و دوازدهه (اثنی عشر) شما را به وضوح ببیند .

این تست برای افرادی استفاده می شود که :

- دچار سوزش سر معده ، درد شکم و خونریزی غیر طبیعی هستند .
- تشخیص زخم ، پلیپ و توده های دستگاه گوارش فوقانی
- گاهی از این تست در مواردی که غذا یا جسم خارجی در مری گیر کرده باشد استفاده می شود .
- در موارد کنترل خونریزی و برداشتن پلیپ نیز استفاده می شود .

روش انجام اندوسکوپي :

روش انجام این فرآیند بصورتی است که یک لوله قابل انعطاف (مجهز به منبع نور و گیرنده

ویدئویی) را از طریق دهان وارد دستگاه گوارش می کنند . علاوه بر مشاهده داخلی دستگاه گوارش توسط این روش ، امکان نمونه برداری از لحاظ نیز وجود دارد . این آزمایش حدوداً ۳۰ دقیقه به طول خواهد انجامید .

آمادگی های قبل از اندوسکوپي :

- از ۸ ساعت قبل از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید (به استثناء داروهای تجویز شده توسط پزشک)
- در موارد اورژانس محتویات معده توسط دستگاه مکنده (ساکشن) تخلیه خواهد شد .
- در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین ، آسپرین و پلاویکس پزشک خود را مطلع نمایید .
- دندان مصنوعی را قبل از انجام فرآیند از دهان خارج گردد .

- مدارک پزشکی شامل اندوسکوپی های قلبی و جواب آزمایشات خود را همراه داشته باشید .

مراحل حین اندوسکوپی :

- ابتدا شما روی تخت دراز خواهد کشید ، در صورتی که نیاز به تزریق داروهای آرامشبخش احساس شود ، پرستار برای شما یک راه وریدی باز می کند . (رگ می گیرد) و آن را به سرم وصل می کند و داروی آرامبخش از طریق سرم به شما تزریق می شود ، البته اغلب موارد اندوسکوپی بدون نیاز به تزریق داروهای آرامشبخش انجام می شود .
- در مرحله بعد داروی بی حسی به درون حلق شما اسپری خواهد شد این دارو مزه بدی دارد و ممکن است احساس بی حسی توانایی بلعیدن (قورت دادن) را از بین خواهد برد .

- مطمئن باشید در حین انجام آزمایش تنفس شما دچار مشکل نخواهد شد .
- با قرار دادن یک محافظ در دهان از دندان های شما محافظت خواهد شد .
- به هنگام وارد شدن لوله و انجام معاینه در شکم احساس پری و فشار خواهید کرد .

- تنفس و فشار خون شما در طی انجام آزمایش تحت نظر خواهد بود .

پس از انجام اندوسکوپی ممکن است :

- تا یک ساعت قادر به قورت دادن نباشید ، زمانی که توانایی بلعیدن و قورت دادن را به دست آورید می توانید غذا بخورید .
- ممکن است ، تا چند روز گلو درد داشته باشید .
- در صورت استفاده از داروی آرامشبخش (میدازولام) حین اندوسکوپی تا ۲۴

ساعت از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری فرمائید.
عوارض و خطرات احتمالی :

در موارد بسیار نادری احتمال بروز خونریزی ، آسیب به روده ، معده و مری وجود دارد .

درمان جایگزین :

به جای این روش می توان از عکسبرداری نیز استفاده کرد ولی عکسبرداری فقط جنبه تشخیصی دارد و در درمان نقشی ندارد ، ضمناً قدرت تشخیص عکسبرداری کمتر از اندوسکوپی است .