


پانسمان ضدآب بر روی محل، میتواند استحمام کند.

- سوزن پورت میتواند بسته به محل و التهاب نداشتن، یک هفته تا ده روز، در ناحیه بماند و نیاز به سوزن گذاری مکرر نیست.
- از سفت و طنابی شدن رگ های محیطی بر اثر دارو جلوگیری خواهد شد.
- سیاهرگهای مرکزی بدن، بدلیل ضخیم بودن، بر خلاف سیاهرگهای دست بسیار کمتر دچار آسیب می شوند.



تا چه حد می توان از پورت استفاده کرد؟


انواع زیر پوستی تا حدود ۱۰۰۰ مرتبه تزریق در مخزن قابل استفاده هستند. انواعی که مجرای آن ها از پوست بیرون گذاشته می شود معمولا در کاربردهای کوتاهتر مورد استفاده هستند و تا زمان اتمام دوره درمان قابل استفاده می باشد.

چه خطراتی هنگام کارگذاری وجود دارد؟

جنس پلی اورتان با ضخامت مشابه مغزی خودکار به یکی از سیاهرگ های اصلی بدن در محل اتصال آن به قلب ارتباط پیدا می کند. سایز محفظه های موجود در بازار متفاوت است و با توجه به جثه و سن بیمار انتخاب می شود

مزایای پورت چیست؟

- از رگ گیری و تزریقات دردناک مکرر در وریدهای محیطی جلوگیری می شود .
- خطر بروز نکروز و آسیب بافتی در صورت خروج ناخواسته داروهای شیمی درمانی از رگ کمتر می شود.
- دسترسی دائمی و مطمئن به ورید مرکزی برای تزریق داروی شیمی درمانی با سرعت زیاد فراهم می شود.
- کبودی و احتمال خونریزی به خصوص در بیماران با پالکت پایین کمتر می شود.
- امکان شیمی درمانی طولانی مدت فراهم می شود.
- راه ارتباطی از نظر نفوذ آلودگی به بیرون ندارد، چون تمامی سیستم در زیر پوست قرار میگیرد. بیمار میتواند با آزادی کامل به فعالیت روزمره بپردازد و حتی روز بعد از جراحی با گذاشتن



پورت چیست؟

پورت از ابزارهای دستیابی به ورید های مرکزی است. این وریدها بر خلاف وریدهای محیطی ، در زیر پوست قابل مشاهده و لمس نیستند و قطری به مراتب بیشتر دارند .از پورت می توان در کلیه تزریقات وریدی و نمونه گیری از خون استفاده کرد. تمام کسانی که برنامه درمانی طولانی مدت وریدی دارند ، می توانند با پورت گذاری ، برای همیشه از رگ گیری های مکرر (که حداقل هر ۳ روز یکبار انجام می شود) رهایی یابند

پورت محفظه ای فلزی یا پلاستیکی است که دارای یک مخزن و یک لوله ارتباطی می باشد .مخزن از نظر اندازه مشابه صفحه ساعت مچی است و در زیر پوست در قسمت بالای قفسه سینه در سمت راست یا چپ قرار داده می شود و مخزن پورت کت توسط لوله باریکی از



مجتمع تخصصی و فوق تخصصی شهید مطهری

تهیه کننده: نازنین مهرپوری

واحد آموزش ضمن خدمت درمانگاه‌های

تخصصی و فوق تخصصی امام رضا(ع)

و شهید مطهری

پورت کت

پاییز ۱۴۰۰

مشکلات احتمالی:

- عفونت : عفونت ممکن است داخل کاتتر یا اطراف پورت را درگیر کند. اگر ناحیه اطراف پورت قرمز ، متورم و دردناک شد ، درجه حرارت بدن بالا رفت یا احساس لرز ، ضعف ، سرگیجه و مشکل تنفسی ایجاد شد ، بیمار باید آنتی بیوتیک بگیرد ولی اگر چندین بار پشت سر هم عفونت پیش آمد ، باید پورت خارج شود.
- لخته شدن : احتمال دارد در مسیر کاتتر ، لخته ایجاد شود. علائم لخته شدن شامل تورم ، درد و قرمزی در گردن می باشد.
- خونریزی و یا کبود شدن
- هموتوراکس
- کارگذاری نابجای اولیه کاتتر
- ریتم نامنظم قلب
- پنوموتوراکس
- آمبولی هوا و ترومبوز
- نشت عروق

منبع:

Blood journal.ir

Cancer nursing.com

این عمل عموماً عارضه حادی ندارد. ولی می توان عوارضی مثل آسیب دیدن پلورا یا آسیب دیدن سرخرگ گردنی و... اشاره کرد که هر کدام درمانهای خاص خود را دارند که برای انجام این درمان ها به مدت بستری بیشتری نیاز است. در بیمارانیکه مدت طولانی پورت دارند عوارضی مانند عفونت یا بروز لخته در سیاهرگ مورد نظر یا جدا شدن مخزن از مجرای پورت کت و ... ممکن است بروز کند که هر کدام درمانهای خاص خود را دارند. بایستی به محض بروز به پزشک اطلاع دهید.

مراقبت از پورت کت:

- قبل از استفاده از کاتتر پورت جهت تزریق هر گونه ترکیبات دارویی ، فرآورده خونی و مایعات ، از باز بودن مسیر پورت مطمئن باشید و با سرنگ آسپیره کنید .
- پیش از هر تزریق پوست روی پورت ضد عفونی و سپس سوزن بطور عمودی وارد پورت شود.
- پس از تزریق دارو باید پورت با محلولی از هپارین و نرمال سالین برای جلوگیری از لخته شدن خون درون لوله داخل پورت شسته شود.
- اگر پورت در بازوی بیمار باشد ، نباید از دست فشار خون گرفته شود و از سیاهرگ های آن دست خونگیری یا رگ گیری انجام شود و نباید وزن بیش از ۷ کیلوگرم را بلند کنند.