

روش انجام بیوپسی اندومتر

در بیشتر موارد این نمونه برداری در مطب پزشک انجام می‌شود. بیوپسی اندومتر نیازی به بی‌حسی ندارد اما پزشک ممکن است مصرف داروهای ضد درد را ۳۰ دقیقه قبل از مراجعه توصیه کند. این بیوپسی معمولاً ۱۰-۵ دقیقه زمان نیاز دارد. برای انجام آن بیمار روی تخت معاینه قرار می‌گیرد و پاهای خود را بر روی رکاب‌ها قرار می‌دهد (همانند وضعیتی که برای تست پاپ اسمیر لازم است) پزشک وسیله‌ای به نام اسپکولوم را وارد واژن می‌کند تا آن را باز نگه دارد. بعد از تمیز کردن دهانه رحم با استفاده از وسیله‌ای بنام **کورت نوک** (یا وسایل یکبار مصرف که با درد کمتری همراه هستند) نمونه بافت اندومتر بصورت سرپایی برداشته می‌شود و پس از آن نمونه برای بررسی زیر میکروسکوپ و انجام آزمایشات لازم جهت تشخیص سلول‌های غیرعادی همانند سلول‌های سرطانی به آزمایشگاه فرستاده می‌شود.

بیوپسی اندومتر چیست و در چه کسانی انجام میشود؟

هرگاه بافت اندومتر برای مدت طولانی تحت تاثیر مقادیر زیاد استروژن (در مقابل کاهش نسبی پروژسترون) قرار گیرد هیپرپلازی اندومتر (رشد بیش از حد غدد و استرومای اندومتر) رخ می‌دهد. عوامل مستعد کننده آن چاقی- مصرف استروژن تنها- سندروم تخمدان پلی کیستیک- مصرف طولانی مدت تاموکسیفن و دیابت هستند.

علامت اصلی هیپرپلازی اندومتر خونریزی غیرطبیعی رحمی است که در زنان جوان با سیکل‌های بدون تخمک‌گذاری بصورت خونریزی غیرطبیعی متعاقب آمنوره یا الیگومنوره‌ی طولانی مدت و در بیماران حوالی یائسگی بصورت پلی منوره یا منوراژی تظاهر می‌کند.


تشخیص هیپرپلازی اندومتر از طریق **بیوپسی اندومتر** صورت می‌پذیرد.

بیوپسی اندومتر تنها در چند دقیقه و اغلب در مطب پزشک انجام می‌گیرد. این روش یک نمونه برداری ایمن است. بیوپسی اندومتر تاثیری در رفع علائم بیماری ندارد اما پزشک را در تشخیص ناهنجاری‌های موجود یاری می‌کند.



عنوان:

بیوپسی اندومتر



تهیه کننده:

فاطمه امیری پور (کارشناس مامایی)

منبع: نوک ۲۰۲۰

بهار ۱۴۰۱



نکاتی که باید بعد از انجام بیوپسی
رعایت کرد:

**عدم نزدیکی تا زمان قطع خونریزی
**استفاده از مفنایک اسید در صورت
داشتن درد و خونریزی
** در صورت بروز خونریزی شدید
باید به پزشک مراجعه شود.

نکاتی که باید حین انجام بیوپسی
در نظر گرفته شوند:

** تست بارداری منفی
** سونوگرافی واژینال در زنان یائسه
با خونریزی غیرطبیعی و در صورتیکه
ضخامت اندومتر مساوی یا بیشتر از ۶
میلیمتر باشد.
**انجام بیوپسی اندومتر در مرحله
حاد خونریزی ممنوع است.
** عدم مصرف داروهای ضدانعقاد از
۳ روز قبل از انجام بیوپسی.