

## پولیپ اندومتر (Endometrial polyp):

پولیپ ها رشد بیش از حد غدد و استرومای اندومتر به صورت لوکال می باشند و ممکن است پایه دار یا بدون پایه باشند.

۱۰ تا ۲۴ درصد خانم هایی که بیوپسی اندومتر یا هیستریکتومی می شوند دارای پولیپ می باشند..

پولیپ اندومتر در خانم های کمتر از ۲۰ سال نادر است. سپس با افزایش سن انسیدانس زیاد می شود تا اینکه در دهه پنجم زندگی به پیک خود می رسد و بعد از یائسگی به تدریج کاهش می یابد.

پولیپهای اندومتر مسئول ۲۵ درصد موارد AUB می باشند.

علائم:

- متروراژی
- لکه بینی بعد از قاعدگی

تشخیص:

۱. D & C
۲. هیستروگرافی
۳. هیستروسکوپی

\_ D & C:

پولیپهای اندومتر اغلب توسط امتحان میکروسکوپی نمونه های کورتاژ تشخیص داده می شوند.

\_ هیستروگرافی:

هیستروگرافی ممکن است در تشخیص پولیپ های بزرگ کمک کننده باشد.

\_ هیستروسکوپی:

هیستروسکوپی همراه با بیوپسی ارزش تشخیصی بالایی در مورد پولیپ های اندومتر به خصوص انواع کوچک آن دارد.

" شایعترین یافته هیستولوژیک در پولیپ های اندومتر فاز پرولیفراتیو می باشد. در ۶۰٪ درصد

پولیپهای اندومتر هیپرپلازی آدنوماتو و آدنوکارسینوم گزارش شده است."

درمان:

- کورتاژ
- هیستریکتومی
- پروژسترون
- ترکیبات استروژن\_پروژسترون