

## دستورات قبل از کولپوسکوپی

- (۱) عادت ماهیانه نباشید
- (۲) صبحانه یا ناهار میل کرده باشید
- (۳) به ساعت حضور توجه و به موقع در درمانگاه حضور داشته باشید
- (۴) از یک هفته قبل نزدیکی نداشته باشید و پماد داخلی استفاده نکنید
- (۵) در صورت مصرف داروی خاص و یا مصرف داروهای ضد انعقاد مانند آسپرین و هپارین و... به پزشک اطلاع دهید .
- (۶) در صورت داشتن هرگونه بیماری زمینه ای مثل دیابت و فشارخون بالا به پزشک اطلاع دهید .
- (۷) در صورت عقب افتادن قاعدگی قبل از عمل سرپایی جواب آزمایش بارداری منفی لازم می باشد
- (۸) روز قبل از عمل سرپایی حتما دوش بگیرید
- (۹) یک عدد قرص ژلوفن به همراه صبحانه میل شود و در صورت (حساسیت یا مشکل معده و...) از یک عدد شیاف دیکلوفناک استفاده کنید.
- (۱۰) یک نفر همراه داشته باشید
- (۱۱) اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه داشته باشید
- (۱۲) از معرفی نامه و اصل مدارک دو عدد کپی به همراه داشته باشید

## دستورات بعد از کولپوسکوپی

(۱) تا ۳ هفته بعد نزدیکی نداشته باشید

(۲) لکه بینی به علت نمونه برداری طبیعی می باشد نگران نباشید

(۳) در صورت گذاشتن گاز استریل در واژن توسط پزشک در پایان نمونه برداری به شما اطلاع داده می شود و توجه نمایید تا ۴ ساعت بعد از نمونه برداری نوک گاز استریل را گرفته و کاملاً آن را بیرون بیاورید

(۴) نوبت های بعدی جهت آوردن جواب آزمایش حتماً از پذیرش گرفته و شماره پرونده را به پذیرش ارایه دهید

(۵) حتماً از جواب های خود کپی گرفته و اصل آن را نزد خود نگهدارید.