



مجتمع درمانگاهی امام رضا (ع)

و شهید مطهری

سرطان تخمدان

تهیه کننده: خانم ریحانه گلزار کارشناس

مامایی

با نظارت: خانم دکتر فاطمه سادات نجیب

جراح و متخصص زنان، فلوشیپ انکولوژی

واحد آموزش ضمن خدمت


منبع: بیماری زنان کیسترن کنت رایان، بهرام

قاضی جهانی (مترجم) ۱۳۹۰

سرطان تخمدان چیست؟

رشد سلول های سرطانی در تخمدان ها را سرطان تخمدان می گویند. سرطان تخمدان دومین سرطان دستگاه تناسلی زنان بوده و شایعترین علت مرگ و میر در اثر سرطان های زنان می باشد.

حداکثر شیوع سنی سرطان تخمدان بین سنین ۵۰ تا ۵۹ سالگی می باشد. (۸۰٪ موارد پس از یائسگی ، ۱۰٪ موارد در سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی می باشد.)



تظاهرات اولیه:

در مراحل اولیه درد، احساس سنگینی در قسمت تحتانی شکم ضعف خستگی و علائم فشاری مثل تکرر ادرار یا یبوست خونریزی غیرطبیعی رحمی دیده می شود.

متأسفانه بیشتر سرطان های تخمدان بی علامت بوده و زمانی علامت دار می شوند که گسترش سرطان وسیع بوده و به مناطق فوقانی شکم و دیواره شکم رسیده است.

فاکتورهای خطر:

هنوز علت سرطان تخمدان به درستی شناخته نشده است و فاکتورهای خطر عبارتند از:

-سن بالای ۴۰ سال

-نازایی

-خانمی که اصلاً زایمان نکرده است.

-سابقه سرطان پستان و اندومتر در خود شخص

-سابقه خانوادگی سرطان تخمدان

-عوامل تغذیه ای (چربی حیوانی)

-هورمون درمانی

-نژاد سفید پوستی

چه عواملی شانس بروز سرطان تخمدان را کم

می کند؟

* مصرف طولانی مدت قرص های جلوگیری از

بارداری

* سابقه شیردادن

* زایمان

* در آوردن رحم

تشخیص بیماری :

* معاینه کامل فیزیکی

* سونوگرافی

* یافته های آزمایشگاهی

* CT اسکن

تدابیر درمانی:

روش درمانی بر حسب مرحله و درجه بیماری

متفاوت است. در مراحل اولیه بیماری درمان

اصلی و اولیه در تمامی سرطان های تخمدان

جراحی لوله رحمی و رحم و برداشتن تخمدان

و بعد از آن شیمی درمانی انجام می شود.

تمامی بیماران بایستی هر ۳ ماه یک بار معاینه

شوند و آزمایش مخصوص خون (ca125) از

نظر عود بیماری حداقل برای ۲ سال برای آنها

درخواست شود در مراحل پیشرفته

بیماری،علاوه بر برداشتن کامل رحم و

تخمدان نواحی آسیب دیده نیز برداشته می

شود و بیمار تحت شیمی درمانی قرار می

گیرد. شیمی درمانی هر ۳ تا ۴ هفته برای ۶ تا

۹ نوبت انجام می گیرد.

آگاه باشید که:

• اگر تغییر در عادت دفع مدفوع و ادرار

شما ایجاد شده است.

• گلودردی دارید که خوب نمی شود.

• اگر توده ای در پستان یا جای دیگر

شما پدید آمده است.

• هر گونه تغییر واضحی در حال شما

بروز کرده است.

• به سرفه مزمن مبتلا شده اید.

• اگر به خونریزی یا ترشح غیر طبیعی

از هر جای بدن مبتلا شده اید.

• شکایت از بلع سخت یا سوء هاضمه

دارید.

حتما از نظر ابتلا به سرطان بررسی شوید.

